



## แนวทางการปฏิบัติผู้สัมผัสสารเคมีรีซัคเตอร์

### มาตรการปฐมพยาบาล

- ในกรณีที่เข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที ถ้ามวมคอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกหากสามารถทำได้ ล้างอย่างต่อเนื่อง รีบไปพบแพทย์ทันที
- ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที ใช้สบู่อ่อนถ้ามี ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ล้างรองเท้าให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ รีบไปพบแพทย์ทันที
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้อะไรทางปากกับผู้หมดสติ รีบไปพบแพทย์ทันที
- หากหายใจเข้าไป : ย้ายผู้ป่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ รักษาตามอาการ หากยังมีอาการให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

### อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

- การป้องกันดวงตา : สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยชนิดกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี
- การป้องกันมือ : สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ :  
ถุงมือชนิดมาตรฐาน ควรทิ้งถุงมือและเปลี่ยนใหม่ถ้าเห็นว่ามีสารเคมีสัมผัสหรือการทะลุผ่านของสารเคมี  
ถุงมือที่ไม่ยอมให้สารผ่านได้  
ถุงมือยาง
- การป้องกันผิวหนัง : อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบด้วย:ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แวนแบบก๊อกเกิลล์และเสื้อคลุมป้องกัน
- การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว